

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO		MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico	p.c.	i.a.	
ALGODÓN	Ramularia	<i>Ramulariopsis gossypii</i>	1,5 - 3,0 Kg/ ha	1,125 - 2,25 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones con plantas pequeñas y repetir cada 7 - 10 días mientras prevalezcan las condiciones favorables a la enfermedad.
ARROZ	Bruzzone parasitario	<i>Pyricularia oryzae</i>	2,0 - 3,0 Kg/ ha	1,5 - 2,25 Kg/ ha	Al aparecer las panojas y repetir hasta tres aplicaciones con intervalo 10 días
	Helmintosporiosis del arroz	<i>Helminthosporium oryzae</i>			
TOMATE E BATATA	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	3,2 Kg/ ha	2,4 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones preventivas cuando aparezcan las primeras hojas, repitiendo con intervalos de 7 días. Realizar hasta cuatro aplicaciones.
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>			
MAÍZ	Mancha foliar del maíz	<i>Phaeosphaeria maydis</i>	1,5 - 3,0 Kg/ ha	1,125 - 2,25 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones en el estadio V8 a V10 o cuando aparezcan las malezas, observándose el desenvolvimiento de la cultura en función de la precocidad del material utilizado. Reaplicar en intervalos de 7 a 10 días a fin de cubrir adecuadamente el periodo de mayor susceptibilidad de la cultura. Realizar hasta tres aplicaciones.
SOJA	Tizón de la hoja y mancha púrpura de la soja.	<i>Cercospora kikuchii</i>	1,5 - 3,0 Kg/ ha	1,125 - 2,25 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones a partir del estadio R2 (Florecimiento) o cuando aparezcan las malezas. Reaplicar en intervalos de 7 a 10 días. Realizar hasta tres aplicaciones.
	Mancha marrón	<i>Septoria glycines</i>			
	Marchitamiento gomoso del tallo.	<i>Corynespora cassiicola</i>			
BANANO	Sigatoka	<i>Mycosphaerella musicola</i>	1,9 - 2,5 Kg/ ha	1,425 - 1,875 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones preventivas, con intervalo de 7 días en los periodos de mayor incidencia de las malezas. Realizar hasta cuatro aplicaciones.
POROTO	Antracnosis del poroto	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	2,1 - 3,2 Kg/ ha	1,575 - 2,4 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones preventivas, con intervalos de 15 días. Realizar hasta y tres aplicaciones
MANI	Viruela temprana	<i>Mycosphaerella arachidis</i>	1,25 - 1,75 Kg/ ha	1,125 - 1,50 Kg/ ha	Iniciar las aplicaciones preventivas con los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 12 días.
	Viruela tardía	<i>Mycosphaerella berkeleyi</i>			
TRIGO	Roya anaranjada	<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>	2,5 Kg/ ha	1,75 Kg/ ha	Iniciar los tratamientos con los primeros síntomas. Repetir cada 10 - 12 días
	Mancha parda o amarilla	<i>Pyrenophora tritici</i>			
	Roya negra	<i>Puccinia graminis f. sp tritici</i>			
	Mancha de la hoja	<i>Septoria tritici</i>			