

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO
	Nombre común	Nombre científico	
ALGODÓN	Ramularia	<i>Ramularia areola</i>	0,4 L/ ha
	Antracnosis del algodónero	<i>Colletotrichum gossypii</i>	0,5 L/ ha
POROTO	Antracnosis de los porotos	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
	Roya del poroto	<i>Uromyces appendiculatus</i>	0,4 L/ ha
	Mancha angular del poroto	<i>Phaeoisariopsis griseola</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
MAIZ	Cercosporiosis del maíz	<i>Cercospora zea-maydis</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
	Roya común del maíz	<i>Puccinia sorghi</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
SOJA	Roya de la soja	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	0,4 L/ ha
	Oídio de la soja	<i>Microsphaera diffusa</i>	
	Tizón de la hoja y mancha púrpura de la soja	<i>Cercospora kikuchii</i>	
	Mancha marrón	<i>Septoria glycines</i>	
	Antracnosis de la soja	<i>Colletotrichum truncatum</i>	
	Podredumbre del cuello	<i>Rhizoctonia solani</i>	
	Marchitamiento gomoso del tallo, Mancha anillada de la soja	<i>Corynespora cassiicola</i>	
TRIGO	Roya anaranjada del trigo	<i>Puccinia triticina</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
	Golpe blanco o fusariosis del trigo, Podredumbre radical, Tizón de los cereales.	<i>Fusarium graminearum</i>	0,5 L/ ha
	Mancha parda o amarilla del trigo	<i>Pyrenophora tritici - repentis</i>	0,4 - 0,5 L/ ha
Adicionar aceite metilado de soja, en las dosis de 0,25% (500 ml/ ha)			
Adicionar aceite metilado de soja, en las dosis de 0,25% a 0,5% (500 a 1000 ml/ ha)			