

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	EPOCA DE APLICACIÓN	Periodo de Carencia	.L.M.R
	Nombre Comun	Nombre Cientifico				
AVENA MAIZ SOJA SORGO TRIGO	Hierba de sangre	<i>Chamaesyce hirta</i>	35 g/ ha Agregar Coadyuvante tensoactivo no ionico (500 ml)	Pre-Siembra Barbecho químico, desecación o tratamiento de quemado previo a la siembra del cultivo. Se recomienda que en el momento de la aplicación la maleza no exceda los 20 cm de altura o 15cm de diámetro y estén en activo crecimiento sin sufrir estrés. Siempre se obtienen mejores controles cuando las plantas están en prefloración. El complemento de control se obtiene con el agregado de Glifosato, dosis de acuerdo a las recomendaciones del mismo para las malezas presentes.	No aplica	No aplica
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>				
	Ka'are	<i>Chenopodium ambrosioides</i>				
	Santa Lucia (*)	<i>Commelina spp.</i>				
	Mbuy o Rama negra	<i>Conysa bonariensis</i>				
	Falsa Cerraja	<i>Emilia sonchifolia</i>				
	Lecherita o Ñaná kamby	<i>Euphorbia heterophylla</i>				
	Picon blanco	<i>Galinsoga parviflora</i>				
	Vira vira o macela	<i>Gnaphalium spicatum</i>				
	Campanilla o Ysypo-i	<i>Ipomoea spp.</i>				
GIRASOL	Cuatro cantos	<i>Leonorus sibiricus</i>	50 – 70 g/ ha Agregar Coadyuvante tensoactivo no ionico (500 ml)	Pre- Cosecha Desecación del cultivo previo a la cosecha. Se recomienda aplicar a partir de la maduración fisiológica del cultivo (bracteas del capitulo tornándose a color amarillo). La aplicación permite anticipar la cosecha de 07 a 14 días (de acuerdo a la dosis). Importante aplicar con un mayor volumen de caldo que permita buena cobertura al cultivo.	7 días	No aplica
	Ysypó de invierno	<i>Polygonum convolvulus</i>				
	Ka'a tai	<i>Polygonum persicaria</i>				
	Toro ratí	<i>Acanthospermum spp.</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Ganbarrusa	<i>Alternanthera philoxeroides</i>				
	Rabano	<i>Raphanus spp.</i>				
	Kurupay-mí	<i>Aeschynomene rudis</i>				
Ypé rupá	<i>Richardia brasiliensis</i>					
ARROZ	Ka'a ruru o Yuyo colorado	<i>Amaranthus spp.</i>	70-140 g/ ha Agregar Coadyuvante tensoactivo no ionico (500 ml)	Pre-Siembra Barbecho químico, desecación o tratamiento de quemado previo a la siembra del cultivo. Se recomienda que en el momento de la aplicación la maleza no exceda los 20 cm de altura o 15cm de diámetro y estén en activo crecimiento sin sufrir estrés. Siempre se obtienen mejores controles cuando las plantas están en prefloración. El complemento de control se obtiene con el agregado de Glifosato, dosis de acuerdo a las recomendaciones del mismo para las malezas presentes.	No aplica	No aplica
	Lengua de buey	<i>Rumex obtusifolius</i>				
	Altamisa	<i>Ambrosia eliator</i>				
	Taperyvá	<i>Senna obtusifolia</i>				
	Kapi'i uná	<i>Bidens pilosa</i>				
	Typyxa hu o Escoba dura	<i>Sida spp.</i>				
	Ka'a ruru pé	<i>Boerhavia diffusa</i>				
	Araxixú	<i>Solanum americanum</i>				
	Nabo	<i>Brassica spp.</i>				
	Espina colorada o Nuati pyta	<i>Solanum sisymbriifolium</i>				
	Hierba caliente	<i>Spermacoce latifolia</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
	Suico	<i>Tagetes minuta</i>				
Hierba de toro	<i>Tridax procumbens</i>					

*Dosis de SAFLUFENACIL 70 %, superior a 100 g/ ha., puede proporcionar control Pre-emergente sobre malezas susceptibles.