

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVO	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO		INTRUCCIONES DE USO: FORMA DE APLICACIÓN: VIA TERRESTRE	
	Nombre comun	Nombre Cientifico	Producto comercial	Ingrediente Activo	Equipamiento / volumen	Época de Aplicación
SOJA	Carrapicho rastrero o Ype rupá	<i>Acanthospermum australe</i>	60 - 80 gr/ ha	15 - 20 gr/ ha	Pulverizador tractorizado. Picos de 80 a 110 grados Presion en los picos de 380 50 libras por pulgadas y utilizando de 100 a 300 litros de caldo por ha.	
	Carrapicho de carnero o Toro ratí	<i>Acanthospermum hspidum</i>				
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus retroflexus</i>				
	Caaruru espisono o Ataco espinudo	<i>Amaranthus spinosus</i>				
	Kapi'i una o Picao preto	<i>Bidens pilosa</i>				
	Trapoeraba o Santa Lucia	<i>Commelina benghalensis</i>				
	Corda de viola o Ysypo'i	<i>Ipomea grandifolia</i>				
	Desmodio o Taha-Taha	<i>Desmodium tortuosum</i>				
	Lengua de vaca	<i>Rumex acetocella</i>				
	Guanxuma o Typyxa guasu	<i>Sida rhombifolia</i>				
	Garrapicho grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>				
Navo silvestre	<i>Raphanus sativus</i>					