

INSTRUCCIONES DE USO



Defense[®]
400 SC

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ARROZ	Mancha Parda	<i>Bipolaris crizae</i>	600 - 800 cc/ ha	Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
	Pyricularis Grisea	<i>Magnaporthe grisea</i>		
CAÑA DE AZÚCAR	Roya anaranjada	<i>Puccinia kuehni</i>	300 - 700 cc/ ha	Realizar la primera aplicación al inicio de la formación de botones. La dosis dependerá de las condiciones ambientales que favorezcan la infección. Es recomendable hacer las aplicaciones en forma preventiva.
MAÍZ	Cercosporiosis	<i>Cercospora zea - maydis</i>		
	Mancha de Phaeosphaeria	<i>Phaeosphaeria maydis</i>		
	Roya común	<i>Puccinia polysora</i>		
	Helmintosporiosis	<i>Helminthosporium turcicum</i>		
MANÍ	Viruela temprana	<i>Cercospora arachidicola</i>	300 - 500 cc/ ha	Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
	Viruela tardía	<i>Cercospora personatum</i>		
SOJA	Alternaria	<i>Alternaria Spa</i>	300 - 700 cc/ ha	Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y el cultivo se encuentre en la etapa de llenado de grano (R4). Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. Volumen de agua 200 L/ha.
	Antracnosis	<i>Colletotrichum truncatum</i>		
	Septorios	<i>Septoria Glycines</i>		
	Mancha ojo de rana	<i>Cercospora sojina</i>		
	Roya asiática	<i>Phakopsora</i>		
	Mildio	<i>Peronospora manshurica</i>		
SORGO	Roya común	<i>Puccinia sorghi</i>		Inicio aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad; repetir en caso necesario a intervalos de 7 días. Realizar un máximo de 4 aplicaciones.
TRIGO	Septorios	<i>Septoria Tritici</i>		Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección.
	Oidio	<i>Blumeria graminis</i>		
	Roya de la Soja	<i>Puccinia Triticina</i>		
	Mancha amarilla	<i>Drechslera Tritici</i>		
	Helmintosporiosis	<i>Helminthosporium graminearum</i>		