

# INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO		
ALGODÓN	Cola de zorro	<i>Cenchrus echinatus</i>	1,6 -2 L/ ha.	Se debe aplicar a la superficie del suelo durante la siembra o inmediatamente después de esta, antes que las malezas o el cultivo hayan emergido.
	Kapi'i una	<i>Bidens pilosa</i>		
	Santa Lucía	<i>Commelina benghalensis</i>		
	Bachiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i>		
	Typycha hú	<i>Sida rhombifolia</i>		
	Verdolaga	<i>Potulaca oleracea</i>		
ARROZ	Capin arroz-arrorá	<i>Echinochloa crusgalli</i>	secano 1,4 -1,8 L/ ha. irrigado 0,8 -1,2 L/ ha	En el cultivo de arroz de regadío, aplicar inmediatamente después de sembrar el cultivo o puede aplicarse después de que emerge el arroz.
	Cola de zorro	<i>Setaria spp</i>		
	Pasto colorado	<i>Echinochloa colonum</i>		
	Pasto colonial	<i>Panicum maximun</i>		
	Pasto de cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis</i>		
	Santa Lucía	<i>Commelina benghalensis</i>		
	Bachiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i>		
SOJA Y MANI	Albahaca silvestre	<i>Galinsoga parviflora</i>	1,5 - 2 L/ ha.	Una sola aplicación, Pós-plantio, pré-emergencia de las malezas y del cultivo.
	Capin arroz	<i>Echinochloa crusgalli</i>		
	Typycha hú	<i>Sida rhombifolia</i>		
	Kapi'i pe'i	<i>Cynodon dactilon</i>		
	Cola de zorro	<i>Setaria spp</i>		
	Pasto de cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis</i>		
	Sorgo alepo	<i>Sorghum halepense</i>		
	Verdolaga	<i>Potulaca oleracea</i>		
	Toro rati	<i>Acanthospermum australe</i>		
	Kapi'i ati	<i>Cenchrus echinatus</i>		
	Nabo	<i>Raphanus raphanistrum</i>		
	Pasto pie de gallina	<i>Eleusine indica</i>		
	Karuru	<i>Amaranthus hybrids</i>		
	TABACO	Pasto de cuaresma		
Kapi'i ati		<i>Cenchrus echinatus</i>		
Sorgo alepo		<i>Sorghum halepense</i>		
Eleusine		<i>Eleusine indica</i>		
Pasto bermuda		<i>Cynodon dactilon</i>		
Typycha hú		<i>Sida rhombifolia</i>		
Verdolaga		<i>Potulaca oleracea</i>		