

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVO	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCCO	Momento de la aplicación
	Nombre común	Nombre Científico		
MAÍZ - SORGO	Cadillo	<i>Cenchrus erchinatus</i>	1,5 - 2,0 L/ ha	Con malezas pequeñas y el cultivo mayor a 40 cm. (chorro dirigido)
	Santa lucía	<i>Commelina benghalensis</i>		
SOJA	Pasto colchón	<i>Digilaria sanguinalis</i>	1.0 - 2.0 L/ ha	Cuando los granos estén fisiológicamente maduros
	Pasto cororado	<i>Echinochloa crusgalli</i>		
CAÑA DE AZÚCAR	Kapi'í rovy	<i>Brachiaria plantaginea</i>	2.5 - 3.0 L/ ha	Pre cosecha. Con malezas pequeñas y el cultivo mayor a 40 cm. (chorro dirigido). Quemar 5 a 10 días después, procedimiento entonces a la cosecha.
SIEMBRA DIRECTA	Lecherita	<i>Euphorbia heterophylla</i>	2.0 L/ ha	Antes de la siembra de cultivos anuales (Solo en mezcla con herbicidas específicos para los cultivos a sembrar)
	Albahaca silvestre	<i>Galinsoga parviflora</i>		
CULTIVOS Y PLANTACIONES EN LÍNEA	Cola de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	3.0 - 4.0 L/ ha	Aplicar con las malezas pequeñas (chorro dirigido)
	Araxixú	<i>Solanum americanum</i>		
	Lechoso	<i>Sonchus oleraceus</i>		
PASTURAS Y VERDEOS	Arroz	<i>Oryza sativa</i>	1.0 - 1.5 L/ ha	En pre cosecha de semillas (3 a 7 días antes)
	Raigrás criollo	<i>Lolium multiflorum</i>		
	Ypé rupá	<i>Richardia brasiliensis</i>	1.5 - 3-5 L/ ha	Antes de la resiembra
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		