

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	RECOMENDACIONES DE USO
	Nombre común	Nombre científico		
AVENA CEBADA CENTENO TRIGO	Apio	<i>Apium leptophyllum</i>	0,35 - 0,6 L/ ha	<p>Desde 3 hojas hasta hoja bandera visible. En presencia de crucíferas, bolsa de Pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Mostacilla (<i>Rapistrum rugosum</i>), Mostaza (<i>Brassica nigra</i>), Nabo (<i>Brassica campestris</i>), Nabón (<i>Raphanus sativus</i>) es necesario aplicar en mezclas con MCPA (sal sódica al 28%) 1 a 1,5 l/ha o 2,4 - D (éster butílico al 100%) 0,25 a 0,3 l/ha. Dosis mínima: Con malezas pequeñas (2 a 4 hojas o en estado de rosetas) creciendo activamente.</p> <p>Dosis medias a máximas: Con malezas de mayor tamaño o desarrollo y si las condiciones ambientales son desfavorables (sequía). También se aconsejan para lotes donde predominan Verónica (<i>Veronica sp.</i>), Viola (<i>Viola arvensis</i>) o Senecios (<i>Senecio sp.</i>) o donde se aplique solo. Aplicado en mezclas con MCPA o 2,4-D, el período de tolerancia corresponde al de estos herbicidas; desde 3 a 5 hojas al inicio de macollaje hasta comienzo de encañazón.</p> <p>En aplicaciones tempranas (al comienzo del período de tolerancia) se recomienda MCPA</p>
	Biznaga	<i>Ammi visnaga</i>		
	Callabacilla	<i>Silene gallica</i>		
	Caapiqui	<i>Stellaria media</i>		
	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>		
	Girasol guacho	<i>Helianthus annuus</i>		
	Ortiga	<i>Urtica urens</i>		
	Ortiga	<i>Lamium amplexicaule</i>		
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>		
	Senecio amarillo	<i>Senecio madagascariensis</i>		
	Canchalagua	<i>Veronica sp</i>		
	Pensamiento silvestre	<i>Viola arvensis</i>		
BARBECHO QUIMICO	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	0,3 - 0,45 L/ ha	<p>Las dosis recomendadas para uso en barbecho químico deben ir siempre en mezcla con una dosis mínima de glifosato de 900 g de e.a./ ha</p>
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>		
	senecio	<i>Senecio sp</i>		
	clavel amarillo o yuyo sapo	<i>Wedelia glauca</i>		
	enredadera perenne	<i>Convolvulus arvensis</i>		
	trébol blanco	<i>Trifolium repens</i>		
	trébol de olor	<i>Melilotus spp</i>		
	trébol de los cuernos	<i>Lotus tenuis</i>		
	lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>		
	vicia	<i>Vicia spp</i>		
	malva blanca	<i>Sphaeralcea bonariensis</i>		
	lagunilla	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		
	verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	soja guacha RG	<i>Glycine max</i>		