

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
MANÍ	Viruela temprana	<i>Mycosphaerella arachidis</i>	1,20-1,75 l/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Repetir a intervalos de 10-14 días, conforme sea necesario para mantener el control. En caso de ataque
	Roya del maní	<i>Puccinia arachidis</i>		
	Mancha angular	<i>Ascochyta spp</i>		
PAPA	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1,20-1,75 l/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan 15 cm de alto, o cuando aparezcan los primeros síntomas. Continuar las aplicaciones a intervalos de 7- 10 días, según sea necesario para mantener el control. Con alta incidencia de tizones, utilizar la dosis más alta y acortar el intervalo entre aplicaciones
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>		
POROTO	Antracnosis del poroto	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	1,75 -2,50 l /ha	Comenzar al inicio de la floración o cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad y continuar las aplicaciones a intervalos de 7 - 10 días.
SOJA	Mancha púrpura de la semilla	<i>Cercospora kikuchi</i>	1,60 - 2,60 l/ ha	Primera aplicación 2 a 3 semanas después de la primera floración, 2da aplicación 10 - 14 días más tarde, dependiendo de la gravedad de la enfermedad.
	Cancro del tallo	<i>Phomopsis sojae</i>		
	Tizón del tallo y de lavaina	<i>Diaporthe phaseolorum var. sojae</i>		
TOMATE	Antracnosis del tomate	<i>Colletotrichum phomoides</i>	2,50 - 3,50 l/ ha	Comenzar cuando amenace la enfermedad y repetir a intervalos de 7 - 10 días. Si la enfermedad es grave, acortar los intervalos de las aplicaciones.
	Moho gris de la hoja del tomate	<i>Cladosporium fulvum</i>	1,75 - 2,50 l/ ha	
	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>		
TRIGO	Mancha de la gluma y del nudo	<i>Septoria nodorum</i>	1,75-2,10 l/ ha	La primera aplicación al hacerse visible la hoja bandera y previa a su emergencia y una segunda aplicación 14 días más tarde. Usar la dosis más elevada si las condiciones climáticas son favorables al desarrollo de la enfermedad, o si hay a alguna enfermedad presente al momento de hacer la primera aplicación.