

INSTRUCCIONES DE USO



Seletto®
325 SC

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTOS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Ramularia*	<i>Ramularia areola</i>	0,4 L/ ha	Iniciar las aplicaciones en la aparición de los primeros síntomas. Repetir la aplicación a cada 10-14 días.
	Antracnosis del algodónero*	<i>Colletotrichum gossypii</i>	0,5 L/ ha	iniciar las aplicaciones preventivas en la fase vegetativa, proximo a los 40 días despues de la siembra.
POROTO	Antracnosis de los porotos*	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	Realizar 3 (tres) aplicaciones, iniciando la primera aplicación preventivamente en el estadio fenologico V4., a partir de ahí debera repetir preventivamente las sgtes aplicaciones, con intervalos de 14 días.
	Roya del porto*	<i>Uromyces appendiculatus</i>	0,4 L/ ha	
	Manchas angular del poroto*	<i>Phaeoisariopsis griseola</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	
MAIZ	Cercosporiosis del maíz*	<i>Cercospra zaeae-maydis</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	Realizar las primeras aplicaciones de manera preventiva en la floracion o comunes de la Roya.
	Roya común del maíz*	<i>Puccinia sorghi</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	
SOJA	Roya de la soja**	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	0,4 L/ ha	Realizar la primera aplicación preventiva en el final de la fase vegetativa o maximo en el inicio de la fase productiva de la cultura, entre los estadios VN y R1. Realizar el monitoreo, y realizar la segunda aplicación despues de 15 a 21 días, mismo sin presencia de la Roya.
	Oídio de la soja**	<i>Microsphae diffusa</i>	0,4 L/ ha	Realizar preventivamente 2 (dos) aplicaciones, siendo la primera en el final de la fase vegetativa o maximo en el inicio de la fase productiva de la cultura, entre los estadios V9 y R1. Realizar las siguiente aplicación con intervalo de 15 a 21 días.
	Tizón de la hoja y mancha púrpura de la soja**	<i>Cercopospora kikuchii</i>		
	Mancha marrón**	<i>Septoria glycines</i>		
	Antracnosis de la soja**	<i>Colletotrichum truncatum</i>		
	Podredumbre de cuello**	<i>Rhizocatonia solai</i>		
	Marchitamiento gomoso del tallo, Mancha anillada de soja**	<i>Corynespora cassiicola</i>		
TRIGO	Roya anaranjada del trigo*	<i>Puccinia triticina</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	Realizar como maximo 4 (cuatro) aplicaciones, para el control de las enfermedades del trigo.
	Golpe blanco o fusariosis del trigo, Podredumbre radical, Tizón de los cereales*	<i>Fusarium graminearum</i>	0,5 L/ ha	
	Mancha parda o amarilla del trigo*	<i>Pyrenophira tritici - repentis</i>	0,4 - 0,5 L/ ha	