

INSTRUCCIONES DE USO



| CULTIVOS | PLAGAS | | DOSIS DEL PRODUCTO | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | Nombre común | Nombre científico | | |
| ALGODÓN POROTO SOJA GIRASOL HORTALIZAS | Capín | <i>Echinochloa crus-galli</i> | 0,270 - 0,440 L/ ha | Aplicar a partir de 3 hojas verdaderas hasta macollaje, con la maleza en activo crecimiento. |
| | Pasto cuaresma | <i>Digitaria sanguinalis</i> | | |
| | Sorgo de Alepo de semilla | <i>Sorghum halepense</i> | | |
| | Trigo guacho | <i>Triticum spp.</i> | | |
| | Pasto puna | <i>Stipa brachychaeta</i> | 0,440 - 0,670 L/ha | Aplicar con la maleza en activo crecimiento y un tamaño máximo de 30-40 cm de altura. |
| | Gramón | <i>Cynodon dactylon</i> | 0,800 - 0,935 L/ ha | Aplicar sobre estolones de hasta 15 cm de largo y desarrollo foliar de 10 cm de altura, estando la maleza en activo crecimiento. |
| BARBECHO QUÍMICO | Sorgo de Alepo de rizoma | <i>Sorghum halepense</i> | 0,670 L/ ha | Expansión vegetativa con foliolos extendidos entre 5-15 y 10-30 cm de altura. |
| | Pasto puna | <i>Stipa brachychaeta</i> | | |
| | Gramón | <i>Cynodon dactylon</i> | 0,800 L/ ha | Estadios vegetativos tempranos hasta emisión temprana de macollos. |
| | | | 0,935 L/ ha | Expansión vegetativa con foliolos extendidos entre 5-15 y 10-30 cm de altura. |



AMÉRICA LATINA AGRSCIENCES S.A.