

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
MAIZ RESISTENTE AL GLUFOSINATO DE AMONIO	Eleusine	<i>Eleusine indica</i>	2 a 3 L/ ha	<p>Cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas. Emplear las dosis más bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2 - 4 hojas) y al comienzo del macollaje en gramíneas. Las dosis más altas son para malezas de mayor tamaño. Uso de adyuvantes: En todos los casos se recomienda a razón de 1% del volumen del caldo de aplicación.</p>
	Brachiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i>		
	Yerba lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i>		
	Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>		
	Caruru	<i>Amaranthus hidridus</i>		
	Yerba carnífera	<i>Conyza bonariensis</i>		
	Pasto amargo	<i>Digitaria insularis</i>		
	Capín colchón	<i>Digitaria horizontalis</i>		
	Yuyo rastrero	<i>Amaranthus deflexus</i>		
	Soja voluntaria	<i>Glycine max</i>		
SOJA	Brachiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i>		
	Pasto amargo	<i>Digitaria insularis</i>		
	Capín colchón	<i>Digitaria horizontalis</i>		
	Camalote	<i>Rotboelia exaltata</i>		
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>		
	Yerba carnífera	<i>Conyza bonariensis</i>		
	Yerba lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i>		
	Enredadera	<i>Ipomoea grandifolia</i>		
	Eleusine	<i>Eleusine indica</i>		
	Caruru-de-mancha	<i>Amaranthus viridis</i>		
	Santa Lucía	<i>Commelina benghalensis</i>		