INSTRUCCIONES DE USO

TRICE® 500 SL

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
MAIZ RESISTENTE AL GLUFOSINATO DE AMONIO	Eleusine	*Eleusine indica*	0,8 a 1,2 L/ha	Cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas. Emplear las dosis más bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2 - 4 hojas) y al comienzo del macollaje en gramíneas. Las dosis más altas son para malezas de mayor tamaño. Uso de adyuvantes: En todos los casos se recomienda a razón de 1% del volumen del caldo de aplicación.
	Brachiaria	*Brachiaria plantaginea*		
	Yerba lechosa	*Euphorbia heterophylla*		
	Campanilla morada	*Ipomoea purpurea*		
	Caruru	*Amaranthus hidridus*		
	Yerba carnicera	*Conyza bonariensis*		
	Pasto amargo	*Digitaria insularis*		
	Capín colchón	*Digitaria horizontalis*		
	Yuyo rastrero	*Amaranthus deflexus*		
	Soja voluntaria	*Glycine max*		
SOJA	Brachiaria	*Brachiaria plantaginea*		
	Pasto amargo	*Digitaria insularis*		
	Capín colchón	*Digitaria horizontalis*		
	Camalote	*Rotboelia exaltata*		
	Amor seco	*Bidens pilosa*		
	Yerba carnicera	*Conyza bonariensis*		
	Yerba lechosa	*Euphorbia heterophylla*		
	Enredadera	*Ipomoea grandifolia*		
	Eleusine	*Eleusine indica*		
	Caruru-de-mancha	*Amaranthus viridis*		
	Santa Lucía	*Commelina benghalensis*		

ALAG
AMÉRICA LATINA AGRISCIENCES S.A.