

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre Científico		
MAÍZ RESISTENTE AL GLUFOSINATO DE AMONIO	Euleusine	<i>Eleusine indica</i>	0,6 - 0,85 kg/ ha	Cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas. Emplear las dosis más bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2 - 4 hojas) y al comienzo de la maceollaje en gramínea. Las dosis más altas son para malezas de mayor tamaño. Uso de adyuvantes: En todos los casos se recomienda a razón de 1% del volumen del caldo de aplicación.
	Brachiaria	<i>Brachiaria</i>		
	Yerba lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i>		
	Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>		
	Caruru	<i>Amaranthus hidridus</i>		
	Yerba carnícera	<i>Conyza bonariensis</i>		
	Pasto amargo	<i>Digitaria insularis</i>		
	Capín colchón	<i>Digitaria horizontalis</i>		
	Yuyo rastro	<i>Amaranthus deflexus</i>		
	Soja voluntaria	<i>Glycine max</i>		
SOJA	Brachiaria	<i>Brachiaria plantaginea</i>		
	Pasto amargo	<i>Digitaria insularis</i>		
	Capín colchón	<i>Digitaria horizontalis</i>		
	Camalote	<i>Rotboelia exatata</i>		
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>		
	Yerba lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i>		
	Enderadera	<i>Ipomoea grandifolia</i>		
	Eleusine	<i>Eleusine indica</i>		
	Caruru de mancha	<i>Amaranthus viridis</i>		
	Santa Lucia	<i>Commelina benghalensis</i>		