

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO		OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico			
ALGODÓN	Oruga de la hoja	<i>Alabama argilacea</i>	10 - 13 g/ ha	-	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha	-	
Avena	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	16 - 20 g/ ha	-	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha	-	
CANOLA	Polilla de las coles	<i>Plutella xylostella</i>	16 - 20 g/ ha	-	
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha	-	Utilizar 600 a 1.000 L de caudal /ha de acuerdo con el desarrollo del cultivo, utilizando la dosis de 30 a 50 cc/ha del producto comercial.
PAPA	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	30 - 50 g/ ha	6 - 8 g/ 100 L	
PASTURAS	Langostas	<i>Rhammtocerus sp.</i>	20 - 30 g/ ha	-	
SOJA	Oruga de la soja	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	10 - 13 g/ ha	-	
	Oruga falsa medidora	<i>Pseudoplusia includens</i>	16 - 20 g/ ha	-	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha	-	
SORGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha	-	Utilizar 600 a 2.000 L de caudal/ha de acuerdo con el desarrollo del cultivo.
TOMATE	Broca pequeña del fruto	<i>Neoleucinodes</i>	-	6 - 8 g/ 100 L	
	Polilla minadora del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	-	6 - 8 g/ 100 L	
TRIGO	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	16 - 20 g/ ha	-	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	16 - 20 g/ ha		



AMÉRICA LATINA AGRSCIENCES S.A.