

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico	DOSIS EN APLICACIÓN	
SOJA	Oruga helicoverpa	<i>Helicoverpa armigera</i>	30 - 60 cc/ ha	Una aplicación para tratamiento de semilla antes de la siembra
	Gusano cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	40 - 60 cc/ha	
	Barrenador del cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	80 - 100 cc/ ha	
	Coró	<i>Lyogenis foscus</i>		
	Picudo del tallo de la soja	<i>Stemecus subsignatus</i>		
	Vaquita verde amarilla	<i>Diabrotica speciosa</i>		
	Gusano falso medodor	<i>Pseudoplusia includes</i>		
	Gusano cogollero del sur	<i>Spodoptera eridanea</i>		
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci biótipo b</i>	80 cc/ ha	
	Oruga de las legum inosas	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	100 cc/ ha	
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	5 - 20 cc/ ha	
GIRASOL	Oruga helicoverpa	<i>Helicoverpa armigera</i>	30 - cc/ ha	
	Gusano cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	40 - 60 cc/ha	
	Vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	80 - 100 cc/ ha	
	Oruga de las legum inosas	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	100 cc/ ha	
MAÍZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	35 - 50 cc/ ha	
	Trips	<i>frankliniella willam si</i>	50 - 70 cc/ ha	
	Gusano cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	70 cc/ ha	
	Coró	<i>Lyogenis foscus</i>	20 - 40 cc/ ha	
SORGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	35 - 50 cc/ ha	
	Gusano cortador	<i>Agrotis ipsilon</i>	70 cc/ ha	
	Barrenador del cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	70 cc/ ha	
	Trips	<i>frankliniella willam si</i>	50 - 70 cc/ ha	
ARROZ IRRIGADO	Gorgojo acuático	<i>Oryzophagus oryzae</i>	20 - 80 cc/ ha	
ALGODÓN	Barrenador del cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	45 - 60 cc/ ha	