

INSTRUCCIONES DE USO



BOXER MIX®

350 SC

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre Científico		
ARROZ	Chinche de la panícula	Oebalus poecilus	150 - 200 ml / ha	Aplicar al inicio de la infestación. Re aplicar a casa 7 días, máx. 3 aplicaciones si ocurre re infestación.
ALGODÓN	Picudo del algodón	Anthonomus grandis	200 - 250 cc / ha	Iniciar cuando el nivel de infestación llegue máx. a 5% de botones florales atacados. Re aplicar luego de 7 días. Máx. 3 aplicaciones.
GIRASOL	Vaquita	Diabrotica speciosa	300 - 400 ml / ha	Iniciar cuando aparezcan los primeros síntomas. Hacer 2 aplicaciones cada 7 días. Máx. 2 aplicaciones.
	Lagarta-preta-das-hojas.	Chlosgne lacinia saundersii	100 - 300 ml / ha	Pulverizar cuando aparecen las primeras lagartas. Re aplicar por reinfestación, a los 7 días. Máx 2 aplicaciones.
	Chinche verde pequeño	Piezodorus guildinii	300 - 400 ml / ha	Pulverizar cuando aparecen los primeros chinches. Re aplicar si fuera necesario a los 7 días. Máx. 2 aplicaciones.
	Chinche verde	Nezara viridula		
	Chinche marrón	Euschistus heros		
MAIZ	Gusano cogollero.	Spodoptera frugiperda	200 - 250 ml / ha	La mayor dosis debe ser utilizada cuando las lagartas estén en estadio de desarrollo entre el 2o e 3o instar, en condiciones de alta población o cuando las plantas estén en el estadio de 6 a 8 hojas. Pulverizar cuando el 20% de plantas estén con síntomas de ataque, con hojas raspadas por el insecto. Max. 2 aplicaciones.
	Percevejo-barriga-verde.	Chichelops melacanthus	150 - 250 ml / ha	Pulverizar al inicio del desarrollo del cultivo, cuando el ataque es más severo. La mayor dosis debe ser utilizada en condiciones de alta población de la plaga o en plantíos en que el cultivo anterior fuera trigo. Max. 2 aplicaciones.
	Trips - Tripes.	Frankliniella williamsi	200 - 250 ml / ha	Pulverizar al inicio del desarrollo del cultivo, cuando el ataque es más severo. Max. 2 aplicaciones.
SOJA	Lagarta de la soja	Anticarsia genmatalis	150 - 200 ml / ha	Utilizar a dosis más alta en caso de alta presión de la plaga. Inspeccionar periódicamente el cultivo y pulverizar cuando aparecen las primeras plagas. Max. 2 aplicaciones.
	Chinche verde	Nezara viridula	150 - 180 ml / ha	Iniciar el tratamiento cuando sean encontrados los primeros chinches. Max. 2 aplicaciones.
	Chiche marrón	Euschistus heros	200 ml / ha	
	Chinche verde pequeño	Piezodorus guildinii	150 - 180 ml / ha	
	Vaquita	Diabrotica speciosa	75 - 100 ml / ha	Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Max. 2 aplicaciones.
Mosca Blanca / Mosca-branca.	Bemisia tabaci	250 ml / ha	Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Reaplicar con 10 días de intervalo. Max. 2 aplicaciones.	
TRIGO	Chinche barriga verde	Dichelops melacanthus	150 ml / ha	Pulverizar al inicio del desarrollo del cultivo, cuando el ataque es más severo. Max. 2 aplicaciones.
	Pulgón verde	Rhopalosiphum graminum	40 - 50 ml / ha	Iniciar las pulverizaciones a partir del macollaje del cultivo. Max. 2 aplicaciones.