

# INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVO	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre Científico		
ALGODÓN	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	1,0 L/ ha	Aplicar al eclosionar los huevos o tan temprano como sea posible al iniciarse el desarrollo larval. Es necesario emplear suficiente agua para mojar todo el follaje. Aplicar con un mojamineto de 150 a 300 L agua/ ha, según el desarrollo del cultivo. Repetir si es necesario entre 7 a 10 días, según dosis empleada y nivel de infestación de la plaga
	Gusano cogollero	<i>Helicoverpa armigera</i>	0,8 - 1,2 L/ ha	
	Ácaro blanco	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	1,25 L/ ha	
	Ácaro rayado	<i>Tetranychus urticae</i>	1,0 L/ ha	
	Gusano bellotero	<i>Heliothis virescens</i>	1,0 - 1,5 L/ ha	
SOJA	Gusano bellotero	<i>Heliothis virescens</i>	0,5 - 1,2 L/ ha	
	Gusano cogollero	<i>Helicoverpa armigera</i>	0,6 - 1,2 L/ ha	
	Tríps	<i>Frankliniella schultzei</i>	0,25 - 1,2 L/ ha	
	Gusano falso medidor	<i>chrysodexis includens</i>	0,6 - 1,2 L/ ha	
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
TOMATE	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	25 - 50 L/ 100 L	
	Ácaro rayado	<i>Tetranychus urticae</i>		
	Ácaro del tomate rojizo	<i>Aculops lycopersici</i>		
MAÍZ	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,5 - 0,75 L/ ha	