

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre Científico		
ALGODÓN	Gusano cogollero	<i>Heliothis virescens</i>	250 a 300 g/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando comience el ataque de las plagas. Utilizar las dosis menores para ataques leves o durante los primeros estadios del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño.
	Isoca	<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>		
	Oruga de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>		
	Oruga militar	<i>Spodoptera sp</i>		
	Pulgón del algodnero	<i>Aphis gossypii</i>		
AVENA CEBADA MAÍZ TRIGO	Gusano cogollero	<i>Heliothis zea</i>	250 a 400 g/ ha	En caso que fuera necesario, volver a aplicar la dosis menor para mantener el control
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
GIRASOL	Isoca de la alfalfa	<i>Colias lesbia</i>	250 a 400 g/ ha	
	Isoca medidora	<i>Rachiplusia un</i>		
SOJA	Isoca	<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>	250 a 400 g/ ha	
	Isoca de la alfalfa	<i>Colias lesbia</i>		
	Isoca medidora	<i>Rachiplusia un</i>		
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
SORGO	Gusano cogollero	<i>Heliothis zea</i>	250 a 400 g/ ha	Comenzar las aplicaciones al notar el ataque y la floración esté entre 10 - 15%.
	Mosquita del sorgo	<i>Contarinia sorguicola</i>		
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		