

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO SEMILLA	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Trips	<i>Frankliniella schultzei</i>	250 - 300 cc/ 100 kg	-
	Ysó Carú	<i>Alabama argillacea</i>	250 - 300 cc/ 100 kg	
	Picudo del algodón	<i>Anthonomus grandis</i>	250 - 300 cc/ 100 kg	
ARROZ	Bicho del arroz	<i>Oryzophagus oryzae</i>	120 - 150 cc/ 100 kg	-
	Cupi'i	<i>Procornitermes triacifer</i>	200 - 250 cc/ 100 kg	
	Cupi'i	<i>Syntermes molestus</i>	200 - 250 cc/ 100 kg	
CAÑA DE AZÚCAR	Broca de la caña	<i>Diatraea saccharalis</i>	-	Aplicar 0,8 L a 1,60 L/ ha en el surco en la implantación del cultivo.
	Cupi'i	<i>Heterotermes tenuis</i>		
	Cupi'i	<i>Cormnitermes cumunans</i>		
	Cupi'i	<i>Neocapritermes opacus</i>		
	Cupi'i	<i>Procornitermes triacifer</i>		
	Migdolus	<i>Migdolus fryanus</i>		
CEBADA	Coro	<i>Diloboderus abderus</i>	100 - 150 cc/ 100 kg	-
	Pulgón verde	<i>Schizap gramimum</i>	100 - 150 cc/ 100 kg	
POROTO	Vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	200 cc/ 100 kg	
	Picudo de la Soja	<i>Sternechus subsignatus</i>	200 cc/ 100 kg	
MAÍZ	Coro	<i>Diloboderus abderus</i>	275 - 350 cc/ 100 kg	-
	Vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	275 - 350 cc/ 100 kg	
PAPA	Vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	-	Aplicar 0,5 L a 0,65 L/ ha en el surco en la implantación del
SOJA	Broca del Cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	200 cc/ 100 kg	-
	Picudo de la Soja	<i>Sternechus subsignatus</i>	200 cc/ 100 kg	
SORGO	Coro	<i>Diloboderus abderus</i>	500 - 700 cc/ 100 kg	
TRIGO	Coro	<i>Diloboderus abderus</i>	100 - 150 cc/ 100 kg	
	Pulgón verde	<i>Schizap gramimum</i>	100 - 150 cc/ 100 kg	