INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico	PRODUCTO	OBSERVACIONES
ALGODÓN	Oruga de la hoja	Alabama argillacea	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Militar	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	Helicoverpa sp.	50 - 65 g/ ha	
AVENA	Oruga del trigo	Pseudaletia sequax	50 - 65 g/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando
	Oruga Militar	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	comience el ataque de las plagas. Utilizar las dosis menores para ataques leves o durante los primeros estadíos del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño. En caso que fuera necesario, volver a aplicar la dosis menor para mantener el control.
CANOLA	Polilla de las coles	Plutella xylostella	50 - 65 g/ ha	
MAÍZ	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	Helicoverpa sp.	50 - 65 g/ ha	
SOJA	Oruga de la soja	Anticarsia gemmatalis	50 - 65 g/ ha	
	Oruga falsa medidora	Pseudoplusia includens	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Militar	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	Helicoverpa sp.	50 - 65 g/ ha	
SORGO	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	
TRIGO	Oruga del trigo	Pseudaletia sequax	50 - 65 g/ ha	
	Oruga Militar	Spodoptera frugiperda	50 - 65 g/ ha	
TOMATE	Broca pequeña del fruto	Neoleucinodes	150 - 200 g/ ha	Aplicar al aparecer las primeras larvas y repetir a intervalos de 7 días o cuando sea necesario, alternando siempre con
	Polilla minadora del tomate	Tuta absoluta	150 - 200 g/ ha	productos de diferente modo de acción. En el caso de minadores foliares, aplica la dosis superior y al detectar las primeras galerías en las hojas.

