

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
ALGOÓN	Oruga de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	20 - 30 g/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando comience el ataque de las plagas. Utilizar las dosis menores para ataques leves o durante los primeros estadíos del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño. En caso que fuera necesario, volver a aplicar la dosis menor para mantener el control.
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	<i>Helicoverpa sp.</i>	20 - 30 g/ ha	
AVENA	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
CANOLA	Polilla de las coles	<i>Plutella xylostella</i>	20 - 30 g/ ha	
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	<i>Helicoverpa sp.</i>	20 - 30 g/ ha	
SOJA	Oruga de la soja	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga falsa medidora	<i>Pseudoplusia includens</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	<i>Helicoverpa sp.</i>	20 - 30 g/ ha	
SORGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
TRIGO	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	20 - 30 g/ ha	
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	20 - 30 g/ ha	
TOMATE	Broca pequeña del fruto	<i>Neoleucinodes</i>	60 - 80 g/ ha	Aplicar al aparecer las primeras larvas y repetir a intervalos de 7 días o cuando sea necesario, alternando siempre con productos de diferente modo de acción. En el caso de minadores foliares, aplicar la dosis superior y al detectar las primeras galerías en las hojas.
	Polilla minadora del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	60 - 80 g/ ha	