INSTRUCIONES DE USO

KILLER FIT® 500 WDG

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Oruga de la hoja	*Alabama argillacea*	50 g/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando comience el ataque de las plagas. Utilizar las dosis menores para ataques leves o durante los primeros estadíos del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño. En caso que fuera necesario, volver a aplicar la dosis menor para mantener el control.
	Oruga Militar	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	*Helicoverpa sp.*	50 g/ ha	
AVENA	Oruga del trigo	*Pseudaletia sequax*	50 g/ ha	
	Oruga Militar	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
CANOLA	Polilla de las coles	*Plutella xylostella*	50 g/ ha	
MAÍZ	Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	*Helicoverpa sp.*	50 g/ ha	
SOJA	Oruga de la soja	*Anticarsia gemmatalis*	50 g/ ha	
	Oruga falsa medidora	*Pseudoplusia includens*	50 g/ ha	
	Oruga Militar	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
	Oruga Helicoverpa	*Helicoverpa sp.*	50 g/ ha	
SORGO	Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
TRIGO	Oruga del trigo	*Pseudaletia sequax*	50 g/ ha	
	Oruga Militar	*Spodoptera frugiperda*	50 g/ ha	
TOMATE	Broca pequeña del fruto	*Neoleucinodes*	150 - 200 g/ ha	Aplicar al aparecer las primeras larvas y repetir a intervalos de 7 días o cuando sea necesario, alternando siempre con productos de diferente modo de acción. En el caso de minadores foliares, aplicar la dosis superior y al detectar las primeras galerías en las hojas.
	Polilla minadora del tomate	*Tuta absoluta*	150 - 200 g/ ha	

ALAG
AMÉRICA LATINA AGRISCIENCES S.A.