

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre Científico		
ALGODÓN	Oruga de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	50 g/ ha	Comenzar las aplicaciones cuando comience el ataque de las plagas. Utilizar las dosis menores para ataques leves o durante los primeros estadios del insecto; las dosis mayores deben utilizarse en ataques severos o con larvas de mayor tamaño. En caso que fuera necesario, volver a aplicar las dosis menor para mantener el control.
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
	Oruga helipoverpa	<i>Helicoverpa armigera</i>	50 g/ ha	
AVENA	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	50 g/ ha	
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
CANOLA	Polilla de las coles	<i>Plutella xylostella</i>	50 g/ ha	
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
	Oruga helipoverpa	<i>Helicoverpa armigera</i>	50 g/ ha	
SOJA	Oruga de la soja	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	50 g/ ha	
	Oruga falsa medidora	<i>Pseudoplusia includens</i>	50 g/ ha	
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
	Oruga helipoverpa	<i>Helicoverpa armigera</i>	50 g/ ha	
SORGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
TRIGO	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	50 g/ ha	
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	50 g/ ha	
TOMATE	Broca pqueña del fruto	<i>Neoleucinodes</i>	150 - 200 g/ ha	Aplicar al aparecer kas primeras larvas y repetir a intervalos de 7 días o cuando sea necesario, alternando siempre con productos de diferente modo. En el caso de minadores foliares, aplicar la dosis superior y al detectar las primeras galerias en las hojas.
	Polilla minadora del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	150 - 200 g/ ha	