

# INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGA		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre Científico		
SOJA	Oruga de la soja	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	10 – 25 cc/ ha	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Aplicar cuando el cultivo presente 20 lagartas/metro lineal o defoliación de 30% antes de la floración o 15% después del inicio, c/ volumen de caldo de 125 - 200 L/ha. Para chinches en infestación baja usar la menor dosis, cuando fuera alta infestación aplicar la mayor dosis. Tres aplicaciones como máximo por ciclo.
	Chinche verde	<i>Nezara viridula</i>	50 – 80 cc/ ha	
ALGODÓN	Oruga de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	120 cc/ ha	Para el control de Acaro Tejedor ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Oruga de la hoja ( <i>Alabama argillacea</i> ) deberán ser realizadas en pulverización, utilizar el volumen de caldo de 300 L/ha. Para el control de Picudo del Algodón ( <i>Anthonomus grandis</i> ) las aplicaciones deberán ser con intervalos máximo de 5 días.
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200 – 240 cc/ ha	
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 – 400 cc/ ha	
	Picudo del algodón	<i>Anthonomus grandis</i>	200 cc/ ha	
	Acaro tejedor	<i>Tetranychus urticae</i>	220 – 240 cc/ ha	
POROTO	Cigarrita verde	<i>Empoasca kraemeri</i>	25 cc/ ha	Aplicaciones deben ser realizadas en pulverización total. Para Mosca blanca aplicar con intervalos máximo de 3 días. Utilizar volumen de caldo de 150 L/ha o superior, tres aplicaciones como máximo por ciclo.
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	250 cc/ ha	
CAÑA DE AZUCAR	Cupi-í	<i>Heterotermes tenuis,</i> <i>Proconitermes triacifer</i>	500 cc/ ha	Aplicar el producto en el surco del plantío. Utilizar volumen de calda de 90 L/ha una sola aplicación por ciclo del cultivo.