

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	EPOCA DE APLICACIÓN
	Nombre Comúm	Nombre Científico		
ALGODÓN	Mosca blanca	<i>Bemisia Tabaci</i>	85 -145 cc/ ha	Aplicar el producto de una o dos aplicaciones durante el ciclo de la cultura con intervalo de 15 dias.
POROTO	Mosca blanca	<i>Bemisia Tabaci</i>	85 -140 cc/ ha	Aplicar el producto al observarse la eclosion de huevos y en la aparición de las primeras ninfas.
SOJA	Mosca blanca	<i>Bemisia Tabaci</i>	75 - 90 cc/ ha	Se recomienda realizar una aplicación en el inicio de las infestaciones.
TOMATE	Mosca blanca	<i>Bemisia Tabaci</i>	25 - 30 cc /ha	Aplicar el producto al observarse la eclosion de huevos y en la aparición de las primeras ninfas. Repetir intervalo de cada 7 a 14 dias para el control de eclosiones posteriores. Como el producto no posee accion directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda la mezcla con un insecticida adulticida. A la dosis mayor el producto manifiesta accion ovicida, principalmente en huevos de 1 a 3 dias de edad.
	Mosca de los invernáculos	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>		

Obs: Se recomienda la mezcla con **ADVANCE 700 WP**, en la dosis de 70 - 80 g/ ha, para eliminacion total de las plagas en todos los estadios fisiologicos.