

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Gusano perillero	<i>Heliothis spp.</i>	120 - 125 cc/ha	Cuando el 20% de las plantas presenten orugas de 6mm. o 10% de plantas con orugas mayores de 6mm.
	Picudo	<i>Anthonomus grandis</i>	85 - 100 cc/ha	Cuando existe 10% de botones florales con daños. Repetir las aplicaciones cada 5 días según necesidad.
	Lagarta rosada	<i>Pectinophora gossypiella</i>		Cuando existe 10% de flores con lagartas o 5% de cápsulas atacadas.
	Yso karu	<i>Alabama argillacea</i>	80 - 100 cc/ha	Cuando se observe 3 orugas por planta. Repetir cuando haya re infestación.
MAÍZ	Gusano cortador	<i>Agrotis spp.</i>	100 -125 cc/ha	Cuando se observen presencia de plagas o plantas cortadas (3 orugas cada 10 plantas o 3% de daño).
	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100 cc/ha	Cuando se observen las primeras hojas raspadas.
SOJA	Oruga de la hoja	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	50 cc/ha	Cuando se observe 10 a 15 orugas por metro lineal de cultivo o 10% de daño foliar.
	Oruga falsa medidora	<i>Chrysodeixis includens</i>	100 cc/ha	Cuando se observe 15 a 20 orugas mayores de 1,5cm. por metro lineal de cultivo y mas de 20% de daño foliar.
	Vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	30 cc/ha	Al observar los primeros ataques.
	Picudo	<i>Sternechus subsignatus</i>	50 - 100 cc/ha	Al observar los primeros síntomas.