

# INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Oruga de la hoja	<i>Alabama argilacea</i>	40 - 50 g/ ha	Aplicar <b>SHOCK 250 WP</b> cuando son constatadas 2 orugas/planta o un 20% de deshojación.
	Oruga capullera	<i>Heliothis spp</i>	75 - 100 g/ ha	
	Gusano Rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	50 g/ ha	Para el control del Gusano rosado, se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> antes de los 80 días. Caso se verifique el nivel máximo de 10% de flores con orugas o 5% de los capullos atacados , repetir cada 15 días las aplicaciones del producto.
	Oruga de las manzanas	<i>Heliothis virescens</i>	80 g/ ha	Para el control de las orugas de las manzanas, se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> cuando el 20% de los punteros estuvieren amenazados.
	Picudo	<i>Anthonomus grandis</i>	60 - 70 g/ ha	Para el control del picudo, iniciar las aplicaciones del <b>SHOCK 250 WP</b> cuando el nivel de los botones florales atacados alcance el máximo 5% , repetir las aplicaciones a cada 8 días o toda vez que el ataque alcance el máximo de 5% de los botones damnificados.
AVENA	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	40 - 50 g/ ha	Para el control de las orugas de la avena, se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> cuando alcance el nivel de daño económico del cultivo.
	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>		
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	80 - 100 g/ ha	Se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> en los primeros síntomas del ataque de las plagas.
	Gusano grasiento	<i>Agrotis ipsilon</i>		
SOJA	Oruga de la soja	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	25 - 30 g/ ha	Aplicar <b>SHOCK 250 WP</b> cuando sea encontrado 40 orugas por batida de paño o 30% de deshojación antes del florecimiento o 15% de deshojación después del florecimiento.
	Oruga falsa medidora	<i>Pseudoplusia includens</i>		
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
SORGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	80 - 100 g/ ha	Se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> en los primeros síntomas del ataque de las plagas.
	Gusano grasiento	<i>Agrotis ipsilon</i>		
TRIGO	Oruga del trigo	<i>Pseudaletia sequax</i>	40 - 50 g/ ha	Para el control de las orugas del trigo, se recomienda iniciar las aplicaciones de <b>SHOCK 250 WP</b> cuando alcance el nivel de daño económico del cultivo.
	Oruga Militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>		