

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO		OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico			
Algodón	Ácaro blanco	<i>Polyphagatarrsonemus latus</i>	0,6 - 0,9 L/ ha		Se recomienda utilizar las dosis mayores cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las plagas y/o cuando el cultivo presente mayor foliage. Utilice caudal de 100 a 150 L/ ha, hasta cuatro aplicaciones por zafra.
	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>			
Citrus	Ácaro blanco	<i>Polyphagatarrsonemus latus</i>		20 cc/ 100 L agua	En las fumigaciones con grandes caudales (10 L / planta), evite el deriva, Para todas las plagas se recomienda el máximo de tres aplicaciones por zafra. Si el caudal utilizado es menor que 2.000 L. Utilice la dosis mínima de 300 cc / ha. Iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas de aparición de las plagas y, repetir caso sea necesario.
	Minador de los brotes de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>		30 - 60 cc/ 100 L agua	
Papa	Minador Americano de las hojas	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	1,0 - 2,0 L/ ha		Si el caudal utilizado es menor que 2.000 L. Utilice la dosis mínima de 300 cc / ha. Iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas de aparición de las plagas y, repetir caso sea necesario.
	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	2,0 l/ ha		
Poroto	Ácaro blanco	<i>Polyphagatarrsonemus latus</i>	0,6 - 0,9 L/ ha		Simax 18 EC será más eficaz cuando aplicado en el momento en que aparezcan los primeros síntomas de ataque en el cultivo. Se recomienda repetir la aplicación de 7 a 14 días após la primera fumigación, limitandose a tres aplicaciones por zafra. El caudal recomendado es de 200 a 300 L/ ha.
	Minador Americano de las hojas	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>			
Soja	Ácaro blanco	<i>Polyphagatarrsonemus latus</i>	0,8 - 1,0 L/ ha		
	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>			
Tomate	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	160 - 200 cc/ 100 l agua		Aplique SIMEX 18 EC en el inicio de la infestación, antes del apareamiento de los daños. La cobertura total de la planta es fundamental para el buen control de las plagas. El caudal recomendado es de 1.000 L/ ha y SIMEX 18 EC deberá ser reaplicado caso sea necesario, en un máximo de 03 aplicaciones por zafra.
	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>			
	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>			