

INSTRUCCIONES DE USO



SKIPER®
450 SC

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
ALGODÓN	Acaro tejedor	<i>Tetranychus urticae</i>	180 - 250 cc/ ha	Aspersión foliar según los periodos de aparición de la plaga. Aplicar con un volumen aproximado de 100 a 200 L de agua por hectárea.
	Broca del algodonero	<i>Eutinobothrus brasiliensis</i>		
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	250 - 400 cc/ ha	
	Oruga de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	180 - 200 cc/ ha	
	Oruga militar	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200 - 250 cc/ ha	
	Picudo	<i>Anthonomus grandis</i>		
	Pulgón del algodonero	<i>Aphis gossupii</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Trips	<i>Frankliniellaschultzei</i>		
MAÍZ	Chinche barriga verde	<i>Dichelops furcatus</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Cigarrita de las pasturas	<i>Dichelops maidis</i>		
	Cigarrita del maíz	<i>Deois flavopicta</i>		
	Oruga elasma	<i>Elasmopalpus ligosellus</i>		
MANI	Trips	<i>Enneothrips flaves</i>	180 - 250 cc/ ha	
POROTO	Cigarrita verde	<i>Empoasca kraemeri</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>		
SOJA	Broca del colo	<i>Elasmopalpus ligosellus</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Chinche marrón	<i>Euchistus heros</i>	200 - 250 cc/ ha	
	Chinche verde	<i>Nezaraviridula</i>		
	Chinche verde pequeño	<i>Piezodorus guildini</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Cupin	<i>Procomitermes triacifer</i>		
	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifoli</i>	250 - 400 cc/ ha	
	Tamandú de la soja	<i>Stemechus subsignatus</i>	180 - 250 cc/ ha	
TRIGO	Chinche barriga verde	<i>Dichelops melacanthus</i>	180 - 250 cc/ ha	
	Pulgón	<i>Metopolophium dirhodium</i>		



AMÉRICA LATINA AGRSCIENCES S.A.