

INSTRUCCIONES DE USO



CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS DEL PRODUCTO	MOMENTO DE LA APLICACIÓN
	Nombre Común	Nombre Científico		
CÍTRICOS	Buva - rama negra	<i>Conyza sp</i>	4,0 - 0,6 L/ ha	En preemergencia de malezas
	Ochucha	<i>Parientaria debilis **</i>		
MAÍZ	Perejilillo	<i>Bowlesia incana</i>	2,0 - 2,25 L/ ha + 1,3 L ha de S - metalacloro	En preemergencia de malezas
	Verdonalaga	<i>Portulaca aleracea</i>		
	Chamico	<i>Datura ferox</i>		
BARCECHO QUÍMICO LARGO	Yuyo colorado	<i>Amarantus ssp</i>	1,5 - 2,25 L/ ha	En preemergencia de malezas
	Malva	<i>Anoda cristata</i>		
AVENA, CENTENO	Quínoa	<i>Chenopodium album</i>	1,5 L/ ha	Presiembra del cultivo (***)
	Ortiga mansa	<i>Lamium amplexicuale</i>		
TRIGO, CEBADA	Suico	<i>Tagetes minuta</i>	1,5 L/ ha	Presiembra del cultivo (***)
	Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i>		
ALGODÓN	Enredadera	<i>Polygonum convolvulus</i>	2,0 - 2,25 L/ ha + 1,3 L ha de S - metalacloro	Preemergencia del cultivo (***)
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>		
FORESTALES	Capín	<i>Echinochloa crusgalli *</i>	3,0 - 6,0 L/ ha	Aplicar en preemergencia de malezas, en post-plantación
	Pasto cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis *</i>		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>		